

Rehydion[®] gel



Elektrolytgel till kalv

Rehydion[®]

Rehydion är en smaklig koncentrerad gel bestående av elektrolyter samt pH höjande ämnen. Den kan blandas i mjölk åt kalvar för att upprätthålla syra/ bas-, elektrolyt- och vätskebalansen vid diarréstillstånd. Rehydion påverkar inte den för kalven viktiga koagulationen av mjölken i löpmagen. Att blanda Rehydion i mjölk eller mjölkersättning innebär många fördelar. Genom att kalven erbjuds den smakliga mjölk/Rehydion lösningen, dricker den mer och återhämtar sig snabbare. Viktnedgången minskar, tarmens lokala immunförsvar stärks och eventuella tarmskador läker snabbare.



Användningsområde

Rehydion ges till kalvar med diarré.

Bruksanvisning

Rehydion blandas i mjölk eller vatten. Till kalv ges 80 ml Rehydion per dag, fördelat på två givor (se nedan). En flaska Rehydion räcker för behandling av en kalv i 4 dagar eller 2 kalvar i 2 dagar.

Innehåll

1 liter innehåller: Energi 5 MJ, Glukos 23%, Natrium 11,5%, Kalium 4,5%, Klorid 8,6%

Förpackning

En flaska Rehydion innehåller 320 ml gel.

Rehydion finns i följande förpackningar: 12 flaskor, 4x12 flaskor

Övrigt

Efter en tids lagring förändras färgen på Rehydiongelen. Brunfärgningen beror på en reaktion mellan salter och glukos. Det påverkar inte produktens egenskaper.

Allmänna råd vid diarré

Understödjande behandling med vätska och näring är viktigt vid diarrétillstånd eftersom kroppen förlorar mycket vatten och elektrolyter med den lösa avföringen. Kalven blir snabbt uttorkad om inte förlorad vätska ersätts. Börja därför behandla omgående när kalven fått diarré. Ägna gärna den sjuka kalven lite extra omsorg, sätt upp en värmelampa för att hjälpa den att hålla kroppstemperaturen, håll boxen ren och lägg in extra halm. Om kalven blir slö, apatisk och inte orkar dricka själv krävs att veterinär kommer och ger vätska via dropp. Veterinär skall också tillkallas vid blodig diarré samt vid allvarliga diarréproblem i hela besättningen. God hygien och bra råmjölsrutiner i samband med kalvning förebygger diarréproblem hos kalvar.



1. Skaka flaskan väl.

2. Tag av korken och kläm på flaskan tills måttet på toppen visar 20 ml.



3. Blanda 2x20 ml Rehydion i 2 liter mjölk. Rör om.

4. Ge 2 liter mjölk-Rehydion blandning (40 ml Rehydion) 2 gånger per dag i 2 dagar till kalv.



CEVA Animal Health AB

Annedalsvägen 9, 227 64 Lund

Tel: 046-12 81 00 Fax: 046-14 65 55

kontakt@ceva.com

www.ceva.se