


ÅTERFÖRSÄLJARE: Gårdsservice Sverige AB



www.gardsservice.se



SNABB HJÄLP FÖR "SNABBA MAGAR"

DIETETISK TILLSKOTTSFODER
VID DIARRÉ

Minimal viktninskning,
därför att Biopect är optimerat
för blandning i mjölk



VARFÖR SKA DU ANVÄNDA biopect TILL DINA DJUR?

- Biopect minimerar viktninskning vid diarré, är avsett för inblandning i mjölk.
- Snabb bättring vid snabb insats.
- Kan också användas förebyggande.
- Lätt att använda – kan inte överdoseras.
- Naturprodukt – skapar inte resistens.

Hållbarhet:
24 månader efter tillverkningsdatum

SÅ VERKAR biopect® :


Plantfibrer bildar tillsammans med vätskan en massa som lägger sig som en skyddande hinna i de förstörda slemhinneveckan. Dessutom binder andra plantfibrer vätska, giftiga ämnen och bakterier som snabbt förs ut ur tarmen.

Elektrolyterna skapar en normal vätskebalans i tarmen.

Druvsockret hjälper upptagningen av elektrolyter och ger energi.

Slemhinneveckan läker och tillståndet normaliseras.

BP-sv-02-11_gardsservice



VAD ÄR biopect® ?

biopect® är ett dietiskt tillskottsfoder till kalvar, för att stabilisera vätske- och elektrolytbalansen.


biopect® består av specialbehandlade plantfibrer där elektrolyter och druvsocker är tillsatt.

biopect® är en fin, granulerad, homogen och dammfri produkt utan risk för separation.

biopect® används i perioder med diarréproblem, oavsett om de är bakterie-, virus- eller foderbetingade.

biopect® används också förebyggande. Om det finns risk för fördröjelseffekter som vid foderbyte, förflyttning, inköpta djur och andra stressande situationer.

biopect® är baserat på naturliga produkter utan någon form av skadliga tillsatsämnen eller antibiotika.



Friskt tarmludd

I den friska tarmen är det en god balans i tarmfloran, dominerad av mjölksyrebakterier som trivs i slemlagerna i slemhinneveckan. Näringsämnena blir nerbrutna och upptages snabbt genom tarmväggen tillsammans med den vätska som finns i tarmen.

Ogynnsamma förhållanden kan ligga till grund för att skadliga bakterier förökar sig på tarmväggens slemhinneveck och sänder in giftiga ämnen i dessa.

PROBLEMET DIARRÉ



Förstört tarmludd

Giftämnena gör tarmväggarna slappa samtidigt som det läcker vätska och elektrolyter i tarmen. Detta medför att det skyddande slemlagret förstörs.

Tarmen är nu slapp och utsatt för ett kraftigt bakterieangrepp, slemhinneveckan blir förstörd.

Det är inte mycket näringsämne och vätska som tas upp i detta tillstånd. Kalven är mycket försvagad av vätskebrist och har kraftig diarré.



NON MEDICATED PRODUCT® NON MEDICATED PRODUCT® NON MEDICATED PRODUCT®

DOSERING

Medföljande mått (ca 50 g biopect)

Kalvar:

Ge 1 mått biopect®, upplöst i 2-3 l ca. 400 C varm mjölk eller mjölkersättning, två gånger dagligen i 3-5 dagar. Vid kraftigare diarré ges vid de två första giverna 2 mått biopect®, upprört i 2 l ca. 400 C varm mjölk, mjölkersättning eller vatten. De följande dagarna ges normal dos i mjölk eller mjölkersättning. De angivna doseringarna gäller för en kalv på ca. 50 kg. Justera doseringen upp eller ned i förhållande till kalvens vikt.

Andra djurarter:

1 g/kg levande vikt, upprört i mjölk, mjölkertsättning eller vatten. Går även bra med toppdressing, 2 gånger dagligen i 3-5 dagar.

FÖREBYGGANDE:

Halv dos i tre dagar. Vid diarré är det viktigt att djuren får rikligt med mjölk eller vatten att dricka. biopect bör alltid finnas tillhands då diarré kan uppkomma på olika tider i de första levnadsveckorna.