

KLORKLEEN

REVIDERAD DEN: 19/02/26

**Tabletterna är endast avsedda för professionell användning
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSEKTORN - LIVSMEDELSINDUSTRIER
BRUSANDE TABLETT
FÖR RENGÖRING OCH DESINFICERING AV YTOR**

Fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende	Tablett
Färg	vitt till äggskal
Lukt	Information saknas
Absolut pH-värde :	Ej tillämpligt
pH vid 10g/l	6±1,5
Densitet	Information saknas
Fryspunkt	Ej tillämpligt
Densitet	1±0,1

Miljökriterier :

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om miljökriterier.

Egenskaper :

Brustablett.
Säkra rengörings- och desinfektionslösningar som är lätta att förbereda.
Upplöses på några minuter.
Bredspektrumaktivitet mot mikroorganismer inklusive bakterier, virus, mykobakterier och svamp.
Biologiskt nedbrytbar tablett
Skummar något
Icke-korrosiv för de flesta material som ofta används inom livsmedelsindustrin.

Applicering :

Rengöring och desinficering av medicinska områden (sjukhus, vårdinrättningar) – PT2: ytor, t.ex. väggar, golv, vagnar, ytor, kritiska områden som operationssalar, obduktionsrum, ytor med spill av blod eller andra kroppsvätskor.
Rengöring och desinficering av ytor inom livsmedels- och foderindustri – PT4.

Bruksanvisning:

Applicera en brukslösning av KLORKLEEN med mopp, trasa, svamp, borste, torkduk, skumningsutrustning eller kemikaliebeständig sprayutrustning.
Säkerställ att ytan förblir fuktig under hela kontakttiden.
Efterskölj ytor som kommer i kontakt med livsmedel eller foder med dricksvatten.
Övriga ytor kan lämnas att självtorka.
Brukslösningar av Klorkleen rekommenderas att bytas ut efter 3 dagar vid koncentrationer upp till 5000 ppm, och efter 24 timmar om högre koncentrationer krävs.

KLORKLEEN

REVIDERAD DEN: 19/02/26

Förbered en ny lösning varje dag om lösningen blir utspädd/förorenad.
 Läs produktens tekniska datablad och säkerhetsdatablad före användning.
 Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.
 I överensstämmelse med gällande lagstiftning om rengöringsmedel: (EG) direktiv nr 648/2004.
 Datasäkerhetsblad om beståndsdelarna, för medicinsk personal, kan erhållas genom skriftlig begäran.

Applicering:	Utspädning	Effektivt mot:	Temperatur:	Kontakttid:
Rengöring och desinficering av medicinska områden (sjukhus, vårdinrättningar) – PT2	1 000 ppm aktivt klor 1 tablett till 1 liter	bakterier	20°C	5 minuter
	2 000 ppm aktivt klor 1 tablett till 0,5 liter	Bakterier, jäst	20°C	5 minuter
		Virus	20°C	15 minuter
	5 000 ppm aktivt klor 1 tablett till 0,2 liter	Bakterier, jäst	20°C	5 minuter
		Mykobakterier, virus	20°C	15 minuter
	10 000 ppm aktivt klor 1 tablett till 0,1 liter	Mykobakterier, virus, svamp	20°C	15 minuter
		Bakterier, jäst	20°C	5 minuter
	Rengöring och desinficering för livsmedels- och foderindustri – PT4	2 000 ppm aktivt klor 1 tablett till 0,5 liter	Bakterier, jäst	20°C
Virus			20°C	15 minuter
5 000 ppm aktivt klor 1 tablett till 0,2 liter		Bakterier, jäst	20°C	5 minuter
		Virus, svamp	20°C	15 minuter

Kontrollparametrar :

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om kontrollparametrar.

Förpackning :

Ask 0,8l 0,605kg (kartong 3,78kg)

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

Kvalitet och säkerhet

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>
 Använd biocider på säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
 Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

Föreskrifter

KLORKLEEN

REVIDERAD DEN: 19/02/26

KLORKLEEN är en blandning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach), utan avseende på tillverkningsplats.

Ämnen som omfattas av Reach-förordningen och som ingår i KLORKLEEN har förhandsregistrerats eller registrerats av vårt företag eller av våra leverantörer uppåt i distributionskedjan.

KLORKLEEN innehåller inget ämne som inger mycket stora betänkligheter i kandidatlistan över ämnen för godkännande som offentliggörs och uppdateras regelbundet av ECHA.

BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Troklosennatrium 41,45g

Produkttyp 2: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur;

Produkttyp 4: Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

KLORKLEEN

REVIDERAD DEN: 19/02/26

Effektivitet

Aktivitet	Standard	Testade organismer	Interfererande substans	Kontaktid:	Temperatur	Koncentration:
Bakteriöddöende medel	EN 1276	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin	5min	20°C	2000 ppm active chlorine
	EN 13697	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
		Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	3 g/l bovint albumin	5min	20°C	2000 ppm active chlorine
	EN 13727	Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
	EN 16615	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
Svampöddöande	EN 13697	Aspergillus brasiliensis	3 g/l bovint albumin	15 min	20°C	2000 ppm active chlorine
			3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	15 min	20°C	10 000 ppm active chlorine
	EN 1650	Aspergillus brasiliensis	3 g/l bovint albumin	15 min	20°C	5000 ppm active chlorine
	EN 13624	Aspergillus brasiliensis	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	15 min	20°C	5000 ppm active chlorine
Jästicid	EN 13697	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	5min	20°C	100 ppm active chlorine
			3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	2000 ppm active chlorine
	EN 1650	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
	EN 16615	Candida albicans	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
	EN 13624	Candida albicans	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
Mjukvattenöddöande	EN 14348	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	15 min	20°C	5000 ppm active chlorine
Virusöddöande medel	EN 14476	Adenovirus type 5, murine norovirus, Poliovirus type 1	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	5min	20°C	1000 ppm active chlorine
	EN 16777	murine norovirus, Adenovirus type 5	3 g/l bovint albumin + 3 ml/l erythrocyter från får	15 min	20°C	2000 ppm active chlorine