

BASIC Stallströ



Dokumenterad kvalitetshygien

Ett vetenskapligt formulerat pulver, är säkert att använda och lätt att handskas med. Det förbättrar djurens närmiljö, genom att torka upp och hämmar de skadliga patogena. BASIC Stallströ reducerar fukt och potentiellt farliga gaser som ammoniak. Använd BASIC Stallströ regelbundet för att förebygga sjukdomar, och för att säkra en bättre miljö för friskare djur.

- **Superkvalitet till bra pris**
- **Basic® har en bevisad effekt**
- **Minskar kläckningsplatser för flugor**
- **Hämmar tillväxten av mikroorganismer**
- **Bra absorptionsförmåga**
- **Klumpar finns inte i lager**
- **Bra ammoniakbindning**
- **Bra i alla typer av djurhållning och stallmiljöer**
- **Förbättrar stallmiljön**
- **Minskar luktstörningar från ammoniak**
- **Friskar upp i stallarna**

Beskrivning

BASIC Stallströ är sammansatt av utvalda material, mineral, växtdelar och desinficerande beståndsdelar. BASIC Stallströ används för att förbättra de sanitära förhållandena i alla typer av djurhållning och stallmiljöer.

Användningsområden

Basic Stallströ används för alla typer av djurhållning och alla stallmiljöer för att torka ut, sänka smitt trycket och öka djurens välbefinnande.

Bruksanvisning

Mängden av stallströ som ska spridas bör anpassas efter förhållandena i varje enskild stallmiljö. Under normala omständigheter används cirka 50 g BASIC Stallströ per m² under de första tre dagarna, och därefter sprids det vid behov 1-2 gånger i veckan. Under belastade förhållanden används BASIC Stallströ dagligen.

Dosering

Sprid 50-100 g (en handfull) jämnt per m²
Djupströbädd: 150 g per m²
Bädd/stigar utan strö: 50 g per m²



Dokumenteret effekt mod:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



Gårdsservice

Korsholm 7057
242 97 Hörby
Kundservice 0416-120 00
info@gardsservice.se