

J2/EWODIP®

Spendopp

J2/EWODIP



J2^P
KONCENTRAT / KONSENTRAT / TIVISTE

E W O D I P
5L

KONCENTRAT / KONSENTRAT / TIVISTE
SPENDOPPNINGSMEDEL med PVP-jod
PATTEDYPNINGSMEDEL med PVP-jod
PVP-jodi VEDINKASTO

Spåda med 5 delar vatten före användning.
Förtyndas med 5 dele vand før anvendelse.
Sekoita 1 osa Ewodippiä 5 osaan vettä.

SPENDOPPNINGSMEDEL FÖR
DOPPNING OCH SPRAYNING AV
SPENARNÄR EFTER MÖLKNING
BRUKSANVISNING: 1 del spendopp
blandas med 5 delar vatten. Doppa
spenarna omedelbart efter varje
mjölkning. Spendoppa även senkor
och högsärliga koer.

PATTEDYPNINGSMEDEL TIL
DYPNING OG SPRAYNING AF
PATTERNE EFTER MALKNING
Brugsanvisning: 1 del dyppnings-
medel blandes med 5 dele vand. På-
spray pattene umiddelbart efter hver
malkning. Gøddamer og højstrøjlige
kvæer bør også behandles.

Opbevaring: Må kun opbevares i
originaltætte og ikke sammen
med levnedsmidler.

MSADEFINITEKTONNAHENO
UTARAPÖLTIKE VÄLTIMISEKS.
Seko 1 osa konsentratin 5 osaa vettä.
Kasta risad sööfussele kohe isa
lõpet järgest. Kasta ka sinnelehmade
risad 1 kord nädalas.

LYPÄVN JÄLKEEN KÄYTETTÄVÄ
VEDINKASTOANE.
Sekoita 1 osa Ewodippiä 5 osaa
vettä. Kasta vännit käyttökoosten
het joka lypäy jälkeen. Käsittele
myös ummessa olevien lehmien
vännit.

Legra heidinn.
Legra heidinn.
Kallata kilmunnat aost.
Suogattara jättävevotti.

koskälän/koostamine:
1% jodi / 1000 ml PVP-pud
1% jodi, polyvinülooni
1% jodi PVP-jodi.

Pharmaxim
Pohjois-Suomi, Suomi
Suomenkatu 33,
210 80 Kuopio
Puh. 010 321432

Danmark: Tlf. 96 37 81 11
Suomi: puh. 010 321 500
www.pharmaxim.com

Barcode: 7 311596 070117

ANUOTTA
Käy, anna
Keskelle omni

J2/EWODIP® spendopp

5 liter. Artikelnummer: 607011.

Bakterier som finns på spenhuden och i miljön runt juvret kan mycket lätt tränga in genom spenkanalens mynning efter mjölkningen innan spenkanalen hinner sluta sig.

Spenkanalen stängs först cirka 30 minuter efter avslutad mjölkning.

Om bakterier kommer in kan dessa sprida sig vidare upp i juvret och orsaka juverinflammation (mastit).

Särskilt stor är risken för detta om det finns sår och sprickor på spenar och juver, exempelvis genom spentramp, taggtrådsskador, felaktig mjölkningsteknik etc. För att förhindra dessa bakterier från att ta sig in via spenöppningen måste de avdödas.

Detta sker genom förebyggande åtgärder som spendoppning eller sprayning.

Användning

J2/Ewodip används för doppning av spenarna efter mjölkningen för att hindra mastitframkallande bakterier att komma in i spenkanalen. Spendoppa kvigor två veckor före inkalvning.

Bruks- och spädningsanvisning

Bruksanvisning	Mängd koncentrat	Mängd vatten	Jodkoncentrat i färdig lösning
Doppning av spenarna efter mjölkning. Doppningen ska utföras direkt efter mjölkningen då spenkanalen fortfarande är öppen.	1 del	5 delar	1.660 ppm

Deklaration

Koncentrerad PVP-jod som innehåller 10.000 ppm jod. **J2/Ewodip** koncentrat skall spädas före användning, 1 del koncentrat till 5 delar vatten.

Förpackningsstorlek

5 liter